



核准日期:2007年07月11日
修改日期:2011年04月28日

奥拉西坦胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 奥拉西坦胶囊

商品名称: 欧来宁


英文名称: Oxiracetam Capsules

汉语拼音: AOLAXITAN JIAONANG

【成份】本品主要成份为奥拉西坦。

化学名称: 4-羟基-2-氯代-1-吡咯烷乙酰胺。

化学结构式:



分子式: C₆H₁₀N₂O₃

分子量: 158.16

【性状】本品为硬胶囊，内容物为白色结晶性粉末。

【适应症】适用于轻中度血管性痴呆、老年性痴呆以及脑外伤等症引起记忆与智能障碍。

【规格】0.4g

【用法用量】口服，每次2粒(800mg)，每日2-3次，或遵医嘱。

【不良反应】据国外文献报道，奥拉西坦的不良反应少见，少数患者出现精神兴奋和睡眠异常。本品在357例II期临床研究中，仅个别患者出现恶心和胃部不适。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】1. 肾功能不全者应慎用，必须使用时，应降低剂量。

2. 患者出现精神兴奋和睡眠异常表现时，应减量。

【孕妇及哺乳期妇女用药】本品在孕妇和哺乳期妇女使用的安全性尚不明确，因此不应使用。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】尚不明确。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】药理作用 本品为吡拉西坦的类似物，可改善老年性痴呆和记忆障碍症患者的记忆和学习功能。机理研究结果显示：本品可促进磷酰胆碱和磷酰乙醇胺合成，提高大脑中ATP/ADP的比值，使大脑中蛋白质和核酸的合成增加。

毒理研究 动物研究提示：本品急性毒性低，小鼠灌胃给药10g/kg、静注给药2g/kg和大鼠灌胃给药10g/kg均未见动物死亡；未表现出致突变、致畸作用和生殖毒性。

【药代动力学】本品口服吸收迅速，入血后能迅速分布到全身体液。达峰时间为1小时左右，峰浓度为48.34±18.35-54.96±34.73μg/ml，表观分布容积V/F(C)为27.45±21.16-36.18±28.73L，消除半衰期t_{1/2}为3.34±1.59-4.74±1.41小时，总清除率Cl_(S)为6.78±5.50-11.65±5.40L/h。药物消除较迅速，服药后48小时内约40%的原形药经尿中排出。老年组和青年组排泄率常数分别为0.1098±0.0306和0.1295±0.0390h⁻¹，消除半衰期t_{1/2}分别为6.76±1.98和5.88±1.99小时，本品在不同年龄的正常人体内的消除规律基本一致。

【贮藏】遮光，密闭，在阴凉(不超过20℃)干燥处保存。

【包装】聚乙烯塑料瓶装，12粒/瓶，24粒/瓶，200粒/瓶，300粒/瓶；铝塑泡罩包装，12粒/盒，2×12粒/板/盒。

【有效期】36个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准(试行) YBH06622003

【批准文号】国药准字H20031033

【生产企业】

企业名称: 石药集团欧意药业有限公司

生产地址: 石家庄市中山西路276号

邮政编码: 050051

电话号码: 0311-87886158

传真号码: 0311-87039126

网 址: <http://www.ouyipharma.com>

版号: 059B-00-110502